医诊断标准:原则上参照 1984 年全国锥体外系疾病讨论会制定的原发性 PD 病(IPD)诊断标准。

单盲法观察。治疗以息宁控释片为对照组。观察组:服用温肝止颤胶囊,由吉林省中医中药研究院中药所制备。该药由黄芪、人参、白首乌、续断、厚朴、川芎、女贞子组成。上药经科学工艺提取制成药粉,装入胶囊,包装入塑料袋中,经 CO^{60} 灭菌。胶囊重 0.5 g,每克药粉含生药 5.36 g。服法:每次 4 粒,每日 3 次,温开水送服。疗程以 60 天为一疗程。

结果: 其虽在中医老年颤证、UPDS 评定上与对照组疗效一致($P>0.05$),但在 CGI,改善肝阳虚证和躯体症状等方面均明显地优于息宁对照组($P<0.05$ 或 $P<0.01$)。

结论: 温肝益气,解郁活血法确是治疗 PD 的重要治法,温肝止颤胶囊是 PD 的有效药物。

364　自拟消颤汤治疗震颤麻痹疗效观察

丁红战　(新乡市中心医院,中国河南省　453000)

目的: 观察消颤汤(自拟)治疗震颤麻痹之疗效。

方法: 药物组成:白僵蚕 12 g,蜈蚣 2 条,全虫 6 g,钩藤 15 g,白附子 12 g,羚羊角粉 0.3 g(冲服),日 1 剂,水煎服。加减:若肝肾阴虚者加滋补肝肾之品:生地 12 g,山药 20 g,山萸肉 12 g,杭芍 15 g,龟板 15 g,女贞子 12 g,怀牛膝 12 g;气血两虚者合八珍汤以益气养血,加人参 6 g,云苓 9 g,白术 12 g,炙甘草 6 g,熟地 12 g,川芎 9 g,当归 9 g,杭芍 12 g;若痰热内盛者加清热化痰之品:天竺黄 12 g,胆南星 6 g,枳实 10 g,另外口服鲜竹沥口服液。若瘀血者加当归 9 g,川芎 12 g,赤芍 12 g,川牛膝 15 g 以活血通络。服消颤汤最少服 25 剂,最多服 60 剂,平均每人服 42 剂。

结果: 显效 13%,进步 63%,有效 10%,无效 14%。有效率 86%。

结论: 消颤汤有熄风解痉之功效,根据辨证分型分别给予滋补肝肾、益气养血以活其本,清热化痰或活血通络以祛其实,因此收效满意,疗效稳定,未发现副作用。

365　镇颤舒治疗帕金森 21 例疗效观察

丰广魁　(连云港市中医院,中国江苏省　222004)

目的: 研究镇颤舒胶囊对帕金森临床症状的控制和改善水平,及与美多巴类替代药物的相互关系。

方法: 应用自拟中成药镇颤舒治疗 21 例帕金森患者,每次服 4～6 粒,每日 3 次,连服 3 个月统计疗效,疗效标准采用 Webster 功能评分法。

结果: 临床治愈 2 例,显效 12 例,有效 4 例,总有效率 86%。并可提高美多巴的效力,降低其副作用。

结论: 镇颤舒有较好的改善帕金森临床症状的作用,对早、中期效佳,对震颤、肌僵直改善明显,对运动减少改善不著。推测可能与阻止多巴胺降解、增强多巴胺受体对多巴胺的摄取能力有关。

366　中西医结合救治病毒性脑炎的临床观察

李春荣　(天津市第一中心医院,中国天津市　300192)

目的: 观察中西医结合治疗重型病毒性脑炎的临床疗效。

方法: 急性期:(1)降低脑代谢、保护脑细胞;(2)消化道出血予以抑酸剂及冰盐水洗胃;(3)呼吸衰竭者均气管切开、保持呼吸道通畅,病情无改善者立即使用呼吸机辅助呼吸。神昏谵语、四肢抽搐者用安宫